

جدول 4 يوضح الفروق بين المرضى والأصحاء في الاستجابة على مقياس التوافق (النفسي والاجتماعي)

الاعتداد	حدود الثقة		قيمة ت	متوسط الفرق	الانحراف المعياري		المتوسط		البعد
	الأعلى	الأقل			مرضى	أصحاء	مرضى 40=ن	أصحاء 40=ن	
**	13.897	11.0953	26.472	12.925	2.759	1.388	24.075	11.150	التوافق الذاتي
**	13.412	11.338	23.763	12.375	3.146	0.975	24.525	12.150	التوافق المهني
**	14.293	12.307	26.655	13.300	2.979	1.043	14.000	10.700	التوافق الصحي
**	13.611	11.439	22.961	12.525	3.082	1.551	23.700	11.175	التوافق المنزلي
**	12.379	10.271	21.400	11.325	3.198	0.986	21.775	10.450	التوافق الاجتماعي
**	<b>65.424</b>	<b>59.476</b>	<b>41.799</b>	<b>62.450</b>	<b>8.824</b>	<b>3.379</b>	<b>118.075</b>	<b>55.625</b>	<b>المقياس ككل</b>

\*\* يُعتدُّ بها عند 0.01

يوضح الجدول السابق وجود فروق يُعتدُّ بها إحصائياً بين درجات عينة المرضى والأصحاء على مقياس التوافق النفسي والاجتماعي لصالح الأصحاء ويتضح من الجدول حجم تأثير المرض على مرضى الفشل الكلوي المزمن. فيوجد تغير في السلوك حيث ينسحب المريض من الأنشطة الاجتماعية المعتادة ويكون أقل إنتاجية ويترك عمله في بعض الأحيان لعدم قدرته الجسمية، ويتكون لديه شعور بالنقص، وعدم الثقة بالنفس، ويقل دخل الأسرة مما يسبب له مشكلات أسرية، ومجتمعية، ومهنية، وذاتية، وصحية، مما يؤدي إلى عدم توافقه من الناحية النفسية والاجتماعية.