Table 4 Anthropometric measures of the study participants according to age group (n = 21 111)

Sex/age group (years)	Weight (kg) Mean (SD)	Height (cm) Mean (SD)	BMI (kg/m^2) Mean (SD)	WC (cm) Mean (SD)	HiC (cm) Mean (SD)	WHR Mean (SD)
Boys						
6–9	27.1 (7.1)	131.6 (9.3)	15.9 (2.8)	56.9 (8.3)	68.8 (9.8)	0.8 (0.006)
10–13	39.7 (11.2)	148.7 (11.8)	17.7 (3.5)	64.1 (10.0)	78.5 (10.7)	0.8 (0.007)
14–18	57.2 (12.5)	168.3 (10.2)	20.1 (3.6)	70.4 (10.9)	87.2 (12.0)	0.8 (0.007)
Girls						
6–9	26.8 (7.6)	129.3 (9.6)	15.8 (2.8)	55.7 (7.9)	69.2 (9.1)	0.7 (0.006)
10–13	41.0 (10.7)	149.4 (10.0)	18.1 (3.6)	63.8 (10.3)	80.2 (11.8)	0.7 (0.006)
14–18	52.5 (9.9)	159.7 (8.1)	20.5 (3.5)	68.8 (8.7)	89.9 (10.1)	0.7 (0.007)

$P < 0.001$ in all comparisons other than the BMI for the difference between each variable by sex.

$P < 0.001$ in all comparisons for the difference between each variable by age group.

SD = standard deviation; BMI = body mass index; WC = waist circumference; HiC = hip circumference, WHR = waist-to-hip