

Tableau 1 Répartition des diabétiques selon la fréquence des complications et selon le sexe, l'âge et la durée de la maladie, EpiDiaM (n = 1196)

Variable	Complications ^a		Complications par localisation (%)			
	Nbre ^a	%	Néphropathie ^b	Rétinopathie ^b	Cardiopathie ^b	Neuropathie ^b
Population totale	763	63,8	4,8	69,4	50,8	45,6
Sexe						
Femme (n = 930)	618	66,5	6,3	69,6	53,9	47,7
Homme (n = 266)	145	54,5	8,9	74,5	37,2	46,2
Tranche d'âge (ans)						
≤ 49 (n = 132)	65	49,2	12,3	66,2	27,7	46,2
50-59 (n = 564)	363	47,5	6,1	71,6	48,7	48,5
60 ≤ (n = 500)	335	67,0	6,6	70,1	57,3	46,6
Durée de la maladie (ans)						
< 5 (n = 453)	302	66,7	5,6	69,9	45,7	46,0
5-10 (n = 327)	204	62,4	5,9	69,1	53,9	51,0
≥ 10 (n = 406)	256	63,0	8,2	72,3	54,3	46,5

^aEffectif, toutes complications confondues.

^bLa présence d'une complication n'est pas exclusive de la présence d'une autre.