

**Tableau 5 Facteurs indépendants associés à la gravité de l'ATL et à la lourdeur des séquelles après régression**

	<i>p</i>	OR [IC <sub>95%</sub> ]	<i>p</i>	OR <sub>a</sub> [IC <sub>95%</sub> ]
<b>Gravité des ATL</b>				
• Sexe	0,11	1,85 [0,86-3,99]	-	
• Obésité	0,12	0,50 [0,21-1,21]	-	
• Poste de travail (G1)	0,007	2,25 [1,24-4,09]	0,001	2,86 [1,50-5,47]
• Manutention lourde	0,07	0,63 [0,38-1,04]	-	
• Absence de reprise du travail	0,4	1,55 [0,55-4,35]	-	
• Traitement chirurgical	< 0,001	7,60 [2,66-21,71]	< 0,001	9,06 [3,09-26,56]
<b>Lourdeur des séquelles</b>				
• Obésité	0,12	0,41 [0,13-1,25]	-	
• Poste de travail (G1)	0,07	0,58 [0,32-1,05]	-	
• Manutention lourde	0,06	0,63 [0,38-1,03]	-	
• Absence de reprise du travail	0,03	2,5 [1,05-6,10]	-	
• Traitement chirurgical	< 0,001	54,72 [18,84-158,93]	< 0,001	54,72 [18,84-158,93]

ATL : accidents de travail lombaires ; OR : odds ratio ; OR<sub>a</sub> : odds ratio ajusté ; IC<sub>95%</sub> : intervalle de confiance à 95 % ; G1 : groupe I (non qualifiés, artisans et conducteurs de machine).